

# “FRECUENCIA DE ALTERACIONES DE TEJIDOS BLANDOS CAUSADAS POR PRÓTESIS MAL AJUSTADAS EN POBLACIÓN GERIÁTRICA DE LA FUNDACIÓN DE SOCORROS AGUSTÍN GONZÁLEZ DE COSIO, 2018”

**ILSE VALERIA JIMÉNEZ SALAZAR, Rosamaria Juárez Santiago, Dhaniel José Muñoz Fairfoot, Josefina Morales Vázquez, J. Jesús Regalado Ayala**

*Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus I, UNAM, Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México., valeria.ilse.96@gmail.com*

## **Introducción.**

Las lesiones en la mucosa bucal constituyen un problema importante de salud, existen diferentes factores de riesgo que favorecen su aparición; como las prótesis mal confeccionadas, o mal ajustadas que han contribuido a la aparición de lesiones en los tejidos bucales, principalmente en la población geriátrica ya que son ellos los que las usan con mayor frecuencia.

## **Metodología.**

Tipo de estudio, Observacional, prospectivo, transversal, descriptivo, se revisaron a 56 pacientes de la Fundación, el instrumento de recolección de datos fue una ficha epidemiológica, con el índice de la OMS, uso de las medidas de bioseguridad, bajo consentimiento informado de los participantes o del responsable del asilo.

## **Resultados.**

Del total de pacientes revisados, el 21.4% portaba prótesis parcial removible; 23.2% prótesis fija; 28.6% prótesis total; 26.8% no portaban ningún tipo de prótesis. En cuanto a las lesiones el 60.7% no presentaron lesiones; 12.5% presentaron algún tipo de úlcera; 8.9% candidiasis; 8.9% absceso; 7.1% otro trastorno. En cuanto a la localización el 3.6% se presentó en borde bermellón; 1.8% en comisuras; 7.1% en mucosa bucal; 5.4% en lengua; 7.1% en paladar; 14.3% encía o bordes alveolares. **DISCUSIÓN.** **Alpízar** reportó que el 12.5% presento úlcera y es, la que se presentó con mayor frecuencia, dato que coincide con nuestro estudio ya que el 12.5% presentó úlcera como lesión. **Gutiérrez** reporto que el 80% presento úlcera, dato que igualmente coincide con nuestro estudio.

## **Conclusiones.**

La lesión que más se presentó fue algún tipo de úlcera y la localización fue en encía o bordes alveolares, por lo que se sugiere realizar nuevamente tratamientos protésicos en estos pacientes.

## **Palabras Clave.**

GERIÁTRICA, prótesis dental, úlcera.

## **Referencias.**

Hernández, SSE, Lesiones bucales asociadas con el uso de prótesis., *ADM* **71** (5), 221-225 (2014).  
Sánchez, Y, Gutiérrez, M & Castillo, Y, Lesiones en la mucosa oral de pacientes mayores de 60 años y portadores de prótesis., *CCM* **17** (4), 452-60 (2013).