

DETECCIÓN DE FARINGOAMIGDALITIS POR CRITERIOS DE BREESE EN ALUMNOS DE UNA ESCUELA PRIMARIA

ABIMAEEL MANGUILAR SILVERIO, Rafael Olvera Romero, Edgar Campuzano Márquez, Patricia Dorotea Acevedo Ballinas, Irma Araceli Aburto López

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Campus I, UNAM, Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Iztapalapa, C.P. 09230, Ciudad de México., manguilarabimael@gmail.com

Introducción.

La faringoamigdalitis (FA) por Streptococcus β -hemolítico grupo A, constituye un problema de salud pública en niños entre los 5 y 15 años de edad, ya que puede producir fiebre reumática. **Objetivo:** Determinar el porcentaje de alumnos de 3° a 6° que padecen faringoamigdalitis probablemente estreptocócica a través de los criterios de Breese. **Pregunta investigación:** ¿Qué porcentaje de alumnos padecen faringoamigdalitis probablemente estreptocócica detectados a través los criterios de Breese?

Metodología.

Estudio descriptivo, transversal, observacional. **Muestra:** por conveniencia, 63 estudiantes de 3° a 6° año de la escuela primaria Benito Juárez de Cd. Nezahualcóyotl. **Instrumento:** encuesta con los criterios de Breese: adenopatías cervicales, dolor faríngeo, fiebre mayor a 38°C, no se cuantificaron los leucocitos sanguíneos. Son casos positivos si la sumatoria es de 29 o mayor. **Procedimiento:** previo consentimiento informado por parte de los padres de los alumnos de la escuela primaria, se efectuó la aplicación de la encuesta. **Análisis:** Los datos obtenidos fueron registrados y analizados con el programa Excel versión 2010 (Microsoft Office).

Resultados.

De los 63 estudiantes, 16 casos (25.4%) positivos a faringoamigdalitis probablemente estreptocócica, 11 niñas y 5 niños. De ellos, el 100% presentó adenopatías cervicales, dolor faríngeo y faringe anormal y el 75% fiebre mayor a 38° C.

Conclusiones.

Al realizar la detección oportuna de casos de faringoamigdalitis probablemente estreptocócica con los criterios de Breese se puede efectuar diagnóstico oportuno evitando la aparición de la fiebre reumática.

Financiamiento.

Sin financiamiento.

Palabras Clave.

CRITERIOS DE BREESEE, detección de faringoamigdalitis, Streptococcus β -hemolítico grupo A.

Referencias.

Aburto-López, I.A. & Freyre-Galicia, J., Principales problemas de Salud Pública en México (FES ZARAGOZA UNAM, Ciudad de México, 2018).

Secretaria de salud, NOM. , 024 Para la prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en la atención primaria a la salud (1994) Consultado el 10 de Mayo de 2018, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4879670&fecha=11/04/1996.