

PREVALENCIA DE HÁBITOS ORALES PARAFUNCIONALES Y SU RELACIÓN CON EL TIPO DE FAMILIA DE PROCEDENCIA, EN UN GRUPO DE PREESCOLARES AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dulce Karina Hernández González¹, José Francisco Murrieta Pruneda¹, Lilia Adriana Juárez López¹, Linares Vieyra Celia², Martha Beatriz González Guevara².

¹Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. ²Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. E-mail: cara_melodi19@hotmail.com; francisco.murrieta@gmail.com

Introducción. Un hábito es cualquier acto adquirido mediante la experiencia y realizado regular e inconscientemente. Los hábitos bucales parafuncionales son los que resultan de la perversión de una función normal, o los que se adquieren por la práctica repetida de un acto que no es funcional ni necesario, pudiendo ser signos de problemas de adaptación o de expresión emocional inadecuada. Su importancia radica en el hecho de que pueden interferir con el desarrollo de la oclusión dental. **Objetivo.** Evaluar la prevalencia de hábitos bucales parafuncionales y su posible asociación con el tipo de familia, en un grupo de preescolares del CENDI “Antonia Nava Catalán” ubicado dentro de las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

Metodología. El estudio fue de carácter epidemiológico, descriptivo, observacional, transversal y prolectivo, en el que 111 preescolares fueron encuestados previa calibración de una examinadora ($k=0.87$, $p=0.001$). La detección de los diferentes hábitos bucales parafuncionales se realizó en dos etapas: 1) aplicación de un cuestionario al padre de familia y 2) valoración clínica del niño.

Resultados y discusión. El 57.7% de la población estudiada presentó, al menos un hábito bucal parafuncional. La onicofagia fue el hábito de mayor prevalencia. La relación entre la prevalencia de hábitos parafuncionales con el tipo de familia resultó ser significativa ($X^2=87.439$, $p=0.0001$).

Conclusiones. La prevalencia de hábitos bucales parafuncionales fue alta, la cual estuvo asociada con el tipo de familia, asimismo, el hábito parafuncional más frecuente fue la onicofagia.

Palabras clave: respiración bucal, bruxismo, queilofagia, succión digital, onicofagia, succión digital.

Bibliografía:

- Cortese S. Relationship between dysfunctions and parafunctional oral habits, and temporomandibular disorders in children and teenagers. Arch Argent Pediatr. 2009; 107(2):134-8.
- López L, Singh G, Feliciano N, Machuca Mdel C. Associations between a history of breast feeding, malocclusion and parafunctional habits in Puerto Rican children. P R salud Sci J. 2006; 1:31-4.
- Ștefănescu I, Zetu I, Rusu M. News on prevalence of vicious habits in children. Rev Chir Soc Med Med Nat Iasi. 2011; 4:1258-61.