

PREVALENCIA DE HÁBITOS ORALES NOCIVOS Y MALOCLUSIONES EN PREESCOLARES DEL JARDÍN DE NIÑOS “MARÍA IZQUIERDO” DURANTE EL CICLO 2012-2013.

Autores: Sandra Ramirez Rivera, Stefanie Thalia Constantino López

*FES Zaragoza, UNAM. Av. Guelatao no. 66 colonia Ejercito de Oriente. Iztapalapa C.P. 09230 México D.F.
cdsandraramirez@gmail.com; thaliquit@hotmail.com*

Introducción.

Los hábitos bucales nocivos constituyen uno de los principales factores etiológicos causantes de maloclusiones ya que alteran el desarrollo normal del sistema Estomatognático modificando su crecimiento, la posición de los dientes y la relación que guardan entre sí.

Objetivo: Determinar la prevalencia de hábitos orales nocivos y maloclusiones en los preescolares del Jardín de niños “María Izquierdo”.

Metodología.

El estudio realizado fue de tipo observacional, transversal, descriptivo y prolectivo en 152 preescolares del Jardín de niños María Izquierdo. Los datos fueron recolectados mediante cuestionarios contestados por el padre/tutor sobre hábitos orales: succión digital, uso del chupón, deglución atípica y respiración bucal, así como una ficha de examinación, donde se observó plano terminal, arco de Baume, overbite y overjet, considerando maloclusión cuando existió mordida borde a borde, mordida cruzada anterior y posterior, mordida abierta anterior y posterior.

Resultados:

La prevalencia fue de 19.7% hábitos orales nocivos. El hábito más frecuente fue la respiración bucal, presente en el 15.1% de la población; mientras que la de menor prevalencia fue deglución atípica, presente en el 0.7% de la población.

El tipo de maloclusión con mayor prevalencia fue la mordida borde a borde, presente en el 12.5% de la población; mientras que la de menor prevalencia fue mordida cruzada anterior, presente en el 1.3% de la población.

La prevalencia de hábitos orales nocivos y maloclusiones encontrada en los preescolares del Jardín de niños María Izquierdo es baja en comparación a la reportada en otros estudios.

Conclusión.

La presencia de hábitos orales nocivos no precisa la existencia de maloclusiones sin embargo, la detección temprana de los hábitos nocivos es importante para la implementación de tratamientos interceptivos y preventivos.

Palabras clave. Dentición mixta, oclusión, preescolares.

Bibliografía.

Taboada O, Torres A, Cazares C, Orozco L. Bol Med Hosp Infant Mex 2011; 68(6):431-437
Ramirez M., Bulnes L., Guzman L. et al. Odontol Pediatr 2011; 1(10):6-12